

ENCUESTA NACIONAL DEL DOLOR

PRESENTADO A: ASOCIACION COLOMBIANA
PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR
FEDERACION LATINOAMERICANA
PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR

PRESENTADO POR : 
OPINOMETRO®

DICIEMBRE 2000

Nuestro compromiso ético

Adherimos a los códigos de ética en la investigación de mercados y estudios de opinión pública de “AMA” (American Marketing Association), “ESOMAR” (European society for Opinión and Market Research) organización que en conjunto con “ICC” (International chamber of commerce) promueven a nivel mundial la aplicación de normas éticas.

Toda la información confidencial entregada por el cliente la mantendremos en estricta reserva, así como los resultados de los estudios y procedimientos aplicados.

Toda la información de campo será presentada en el informe, al cliente, en forma estadística y general. Nunca la información tendrá tratamiento individual para usos comerciales, ya que guardamos la confidencialidad del contacto establecido (entrevistado).

Toda la información aquí contenida pertenece a Opinómetro ® y es de uso exclusivo para el cliente. Cualquier copia o uso diferente, sin la autorización expresa, será perseguida con acciones penales, civiles y comerciales.


OPINOMETRO®

Ficha Técnica

<u>Estudio</u>	ENCUESTA NACIONAL DEL DOLOR
<u>Realizado por</u>	Solutions Factory Ltda. (Opinómetro)
<u>Encargado por</u>	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR
<u>Población</u>	FEDERACION LATINOAMERICANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR
Elemento	Hombres y mujeres mayores de 18 años
Unidad de muestreo	Hogares con teléfono
<u>Tiempo de realización</u>	Diciembre 4 al 20 de 2000
<u>Tamaño de la muestra</u>	1517 entrevistas
<u>Procedimiento de muestreo</u>	Muestreo por afijación proporcional
<u>Método</u>	Entrevista telefónica
<u>Instrumento</u>	Cuestionario estructurado
Margen de error global	2.9%
Nivel de confianza	95%

Descripción de la técnica

Para realizar este estudio se tuvo una cobertura de once ciudades y se distribuyeron las encuestas proporcionalmente a la población de cada una de estas, luego dentro de cada una de las ciudades se eligió aleatoriamente de los directorios telefónicos las personas a entrevistar.

Campo

Al iniciar el campo se realizó una prueba piloto y al identificar que la incidencia del dolor el día de ayer era muy bajo. Se procedió con autorización de la ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR Y FEDERACION LATINOAMERICANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR ampliar el lapso de tiempo a una

semana

Procesamiento

Para el proceso de análisis de la información Opinómetro procedió realizar el proceso de crítica y supervisión de la información. Luego de esto se inició el proceso de digitación y finalmente se analizó la información mediante programas de tabulación cruzada.



Objetivos

Identificar que porcentaje de la población a sentido algún dolor físico en la última semana.

Conocer en que lugar del cuerpo donde se siente este dolor.

Identificar las causas del dolor.


Determinar la antigüedad de este dolor.

Conocer si las personas hacen algo para mitigar el dolor y por recomendación de quien.


Que tipo de actividades se interrumpen por el dolor.

DEMOGRAFICOS


ESTRAT O




EDAD



SEXO



CIUDAD



HALLAZGOS

SIENTEN DOLOR

SINTIERON DOLOR EN
LA ULTIMA SEMANA Y EN QUE LUGAR


CASI LA MITAD MANIFIESTA HABER SENTIDO ALGUN DOLOR EN LA ULTIMA SEMANA

Han sentido dolor...


CABEZA
30%



**PIERNAS
/PIES**
15%



**TODO EL CUERPO/
MALESTAR GRAL**
7.5%



CAUSAS DEL DOLOR

PRINCIPAL CAUSA DEL DOLOR

NO EXISTE UNA CAUSA GENERALIZADA DEL DOLOR

Un 52.7% nombró diferentes causas incluidas en la opción
otros.

**GRI PA/
RESFRIADO**
16.3%



**GOLPE/
QUEMADURA**
9.4%



**MIGRAÑA/
DOLOR CABEZA**
8.3%



 OPINOMETRO®


QUE HICIERON PARA CALMAR EL DOLOR

ACCIONES QUE TOMARON
FRENTE AL DOLOR

DOS DE CADA TRES PERSONAS TOMARON UNA ACCION ESPECIFICA PARA ALIVIAR EL DOLOR

Un 70.1% hace algo para aliviar el dolor.

**FUE AL
MEDICO
33.1%**



**AUTORECETO
MEDICAMENTO
27.5%**



**TOMO LO QUE
SIEMPRE
HA TOMADO
21.5%**

**Lo
de siempre**

Quién se lo recomendó...

NADIE 39.7%

OPINOMETRO®


INFLUENCIA DEL DOLOR

QUE SUCEDIO CON EL DOLOR

CASI LA MITAD DE LAS PERSONAS NO PUDIERON REALIZAR SUS ACTIVIDADES NORMALES A CAUSA DEL DOLOR

NO PUDO TRABAJAR
O ESTUDIAR 26.4%

RINDIO MENOS EN
TRABAJO O ESTUDIO 25.8%





EL DOLOR Y LAS RELACIONES PERSONALES

**EL DOLOR AFECTA LAS
RELACIONES CON OTROS**


OPINOMETRO®

A MAS DE LA MITAD DE LAS PERSONAS EL DOLOR NO LES AFECTO LAS RELACIONES CON SUS AMIGOS, FAMILIA




LA ALIMENTACION Y EL EJERCICIO

RELACION ENTRE EL DOLOR
LA ALIMENTACION Y EL EJERCICIO


OPINOMETRO®

A MAS DE LA MITAD DE LAS PERSONAS NI LA ALIMENTACION NI EL EJERCICIO LE INFLUYERON EN EL DOLOR

EJERCICIO
57.5%




ALIMENTACION
56.7%



CONSUMO HABITUAL DE MEDICAMENTOS

EL CONSUMO HABITUAL DE
LOS MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR
DISMINUYE O NO LA
EFICACIA DE ANALGESICOS

**DOS TERCERAS PARTES DE LAS
PERSONAS OPINAN QUE SI
DISMINUYE LA EFICACIA DE
LOS ANALGESICOS**



**SI DISMINUYE
LA EFICACIA
65.5%**


LA RELIGION Y LOS ESTADOS DE ANIMO

ALIVIO O AUMENTO DEL DOLOR

TANTO LA RELIGION COMO LOS ESTADOS DE ANIMO INFUYEN EN EL DOLOR



**SI INFLUYE
LA RELIGION
EN EL ALIVIO
DEL DOLOR
56.7%**




**SI INFLUYEN
LOS ESTADOS DE
ANIMO EN EL
AUMENTO DEL DOLOR
76.17%**

OPINOMETRO®

RESULTADOS GRAFICOS GENERALES


SUFRIÓ ALGUN TIPO DE DOLOR FÍSICO EN LA ÚLTIMA SEMANA

BASE: 1517
TÍTULO DE BASE: 1517




PARTES DEL CUERPO EN LAS QUE SUFRIÓ DOLOR

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 736




ANTIGÜEDAD. DEL DOLOR

BASE: 1517
TÍTULO DE BASE: 736




PRINCIPAL CAUSA DEL DOLOR

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 736




TOMO ALGO PARA ALIVIAR ESTE DOLOR

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 781




QUE HICIERON PARA ALIVIAR EL DOLOR

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 516




QUIEN SE LOS RECOMENDO

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 516




EL DOLOR LES IMPIDIO REALIZAR ACTIVIDADES NORMALES

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 736




ACTIVIDAD QUE LES IMPIDIO REALIZAR

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 333




EL DOLOR AFECTA LAS RELACIONES CON FAMILIA, AMIGOS, TRABAJO

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 736




LA ALIMENTACION INFLUYE EN EL HECHO DE TENER EL DOLOR

BASE: 1517
TITULO DE BASE: 736




EL EJERCICIO FISICO INFLUYE EN EL HECHO DE TENER DOLOR


BASE: 1517
TITULO DE BASE: 736



CONSUMIR HABITUALMENTE MEDICAMENTOS PUEDE DISMINUIR LA EFICACIA DE LOS ANALGESICOS



LA RELIGION O LA FE DAN ALIVIO AL DOLOR



EL STRESS, DEPRESION, ALEGRIAS PUEDEN AUMENTAR EL HECHO DE TENER DOLOR

